

Introducción a los Elementos Finitos

Tarea IV

Daniel Castañón Quiroz*¹

¹Departamento de Matemáticas y Mecánica, IIMAS-UNAM, Cd. de México, México

November 24, 2023

1 Instrucciones

Resuelve todos los siguientes problemas posibles. Se calificará para un total de 100 puntos. Si la calificación es mayor a 100 puntos, entonces los puntos extras se tomarán como puntos de recuperación para la calificación final.

2 Problemas teóricos

2.1 Instrucciones

Resolver los siguientes problemas de forma clara y legible. Escanear las páginas y enviarlo al correo correspondiente del profesor de la materia.

1. (10 puntos) Utilizar el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias con condición inicial para demostrar que los siguientes problemas tienen solución única. Adicionalmente, para cada uno de los problemas encuentra su solución única:

(a) $y' = y \cos(t)$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$.

(b) $y' = \frac{2}{t}y + t^2 e^t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 0$.

2. (20 puntos) Demostrar que el **método del punto medio** definido como:

$$\hat{y}_0 = y_0$$
$$\hat{y}_{i+1} = \hat{y}_i + \Delta t \left[f \left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, \hat{y}_i + \frac{\Delta t}{2} f(t_i, \hat{y}_i) \right) \right] \text{ para } i \in \{0, \dots, N\},$$

que se emplea para aproximar la ecuación diferencial ordinaria escalar:

$$y' = f(t, y) \quad t \in (a, b)$$
$$y(a) = y_0.$$

tiene un error de truncamiento de orden $r = 2$. (**Sugerencia:** utilizar el hecho de que f satisface la condición de Lipschitz en la variable y , el teorema de Taylor varias veces, y la desigualdad $x \leq |x| \forall x \in \mathbb{R}$).

*daniel.castanon@iimas.unam.mx

3. (15 puntos) Utiliza el teorema de Taylor con residuo para obtener la siguiente aproximación de segundo orden para una función suficientemente derivable $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$y(x + 2h) = 2y(x + h) - y(x) + Ch^2,$$

donde C es una constante.

4. (20 puntos) Utiliza el teorema de Taylor con residuo para obtener la siguiente aproximación de tercer orden para una función suficientemente derivable $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$y(x + 3h) = 3y(x + 2h) - 3y(x + h) + y(x) + Ch^3,$$

donde C es una constante.

3 Problemas de EDOs en Matlab

3.1 Instrucciones

Todo los problemas se deberán entregar en archivos diferentes con extensión `.m`. Por ejemplo el problema 1 deberá estar en el archivo `Problema_1.m`, etc. Dentro de cada archivo se deberá poner el nombre del estudiante y su correo electrónico. Todos los programas deberán correr y tener solamente el output que se especifica utilizando el comando `disp`. **Para todo los problemas, el único output del programa deber ser una tabla de la forma:**

```
[N_vec' err_max' err_rate']
```

donde `N_vec` es el vector que contiene en cada entrada el número de subintervalos que divide al intervalo global para cada problema, `err_max` el vector que contiene en cada la norma L^∞ , `err_rate` el vector que contiene en cada entrada la tasa de convergencia de la norma L^∞ . Para ello utilizar un número de subintervalos de $N = 4, 8, 16, 32, 64, 128$. **Tomar como referencia el script de matlab número #3 en la lista de 'Métodos numéricos para EDOs 1D' que esta en el website del curso.**

5. (15 pts) Sea el problema de valor inicial en el intervalo $0 \leq t \leq 1$:

$$y' = y - t^2 + 1,$$

sujeta a $y(0) = \frac{1}{2}$; verificar que su solución analítica es

$$y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2}e^t.$$

Programar el **método del punto medio** (véase problema 2) para resolver este problema. Recordar que este método tiene un error de truncamiento de $O(\Delta t^2)$. Entonces para confirmar que el método es implementado correctamente, verificar (utilizando las instrucciones mencionadas al inicio de la Sección) que la tasa de convergencia calculada debe ser cercana a 2.

6. (15 pts) Sea el problema de valor inicial en el intervalo $0 \leq t \leq 1$:

$$y' = y - t^2 + 1,$$

sujeta a $y(0) = \frac{1}{2}$; verificar que su solución analítica es

$$y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2}e^t.$$

Programar el **método del trapecio** (véase notas de clase) para resolver este problema. Recordar que este método tiene un error de truncamiento de $O(\Delta t^2)$. Entonces para confirmar que el método es implementado correctamente, verificar (utilizando las instrucciones mencionadas al inicio de la Sección) que la tasa de convergencia calculada debe ser cercana a 2.

7. (20 pts) Sea el problema de valor inicial en el intervalo $0 \leq t \leq 2$:

$$y' = -(y + 1)(y + 3),$$

sujeta a $y(0) = -2$; su solución analítica es

$$y(t) = -3 + \frac{2}{1 + e^{-2t}}.$$

Programar el método de **Euler implícito** para resolver este problema. Utilizar el método de Newton con criterio de paro de $\epsilon = 10^{-9}$ de la diferencia absoluta entre aproximaciones sucesivas, y un máximo de iteraciones $N_0 = 100$. Recordar que este método tiene un error de truncamiento de $O(\Delta t)$, entonces verificar que la tasa de convergencia calculada debe ser cercana a 1.

8. (20 pts) Sea el problema de valor inicial en el intervalo $0 \leq t \leq 2$:

$$y' = -(y + 1)(y + 3),$$

sujeta a $y(0) = -2$; su solución analítica es

$$y(t) = -3 + \frac{2}{1 + e^{-2t}}.$$

Programar el **método del trapecio** para resolver este problema. Utilizar el método de Newton con criterio de paro de $\epsilon = 10^{-9}$ de la diferencia absoluta entre aproximaciones sucesivas, y un máximo de iteraciones $N_0 = 100$. Recordar que este método tiene un error de truncamiento de $O(\Delta t^2)$, entonces verificar que la tasa de convergencia calculada debe ser cercana a 2.